

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

Онищенко
«19» 23 2007 г.

№ 01-11/36-07.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лактоглобулина противоколипротейного коровьего, лиофилизата для приготовления раствора для приема внутрь.

Лактоглобулин противоколипротейный представляет собой очищенную фракцию глобулинов иммунного молозива коров, полученную методом спиртового осаждения и лиофилизированную. Специфическим реагентом являются иммунные глобулины, содержащие антитела к патогенным *Escherichia coli* серогрупп 026, 055, 0111, 0119, *Proteus vulgaris* серогруппы 043 и *Proteus mirabilis* серогруппы 035.

Препарат представляет собой стерильный лиофилизат желтовато-белого цвета, легко растворимый в воде, без запаха.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Лечебный эффект препарата обусловлен содержанием специфических антител к *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris* и *Proteus mirabilis*, обладающих антимикробным и токсиннейтрализующим действием.

НАЗНАЧЕНИЕ. Лечение колиинфекций и дисбактериоза, сопровождающегося массивным выделением протеев, у детей раннего возраста.

Вводится взамен инструкции, утвержденной МЗ РФ 28 мая 1990 г.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА. Лактоглобулин применяют внутрь за 20-30 мин до еды. С флакона удаляют металлический колпачок и резиновую пробку, наливают кипяченую воду комнатной температуры из расчета 10 мл (2 чайные ложки) на одну дозу; перемешивают.

При разведении препарат не встряхивать.

В течение 5 мин после добавления воды должна образовываться прозрачная, слабоопалесцирующая жидкость с желтоватым оттенком.

При содержании во флаконе 2-х доз разведенный препарат, закрытый пробкой, допускается хранить при температуре от 2 до 10 °С не более 1 суток.

Не пригоден к применению препарат с нарушенной целостностью упаковки, без маркировки, с изменением физических свойств, при наличии посторонних включений, при неправильном хранении, с истекшим сроком годности.

Препарат назначают с первых дней болезни: детям до 6 мес. – по 1 дозе 2 раза в сутки; детям старше 6 мес. – по 2 дозы 2 раза в сутки.

При легкой и среднетяжелой форме болезни курс лечения от 7 до 14 дней. В тяжелых случаях можно увеличить кратность введения препарата до трех, курс лечения продлить до 21 дня.

Лечение лактоглобулином детей с колиинфекцией проводят на фоне общепринятой антибактериальной и симптоматической терапии.

При лечении детей с дисбактериозом препарат применяют для селективной деконтаминации протеев, гемолитической, лактозонегативной кишечной палочки в комплексе с препаратами, содержащими бифидобактерии и лактобактерии (бифидумбактерин, лактобактерин, ацилакт и др.).

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Реакции на введение препарата не зарегистрированы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Противопоказанием к применению препарата служит индивидуальная непереносимость коровьего молока.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Лактоглобулин совместим с антибиотиками, препаратами нормофлоры (бифидумбактерин, бификол, бифилиз, лактобактерин, ацилакт, аципол).

ФОРМА ВЫПУСКА. Во флаконах по 1 дозе (0,5 г) или по 2 дозы (1,0 г). Упаковка содержит 10 флаконов и инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ. Препарат транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 10 °С. Хранить в сухом, темном и недоступном для детей месте при температуре от 2 до 10 °С.

СРОК ГОДНОСТИ. 4 года. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК. Отпускается без рецепта.

Рекламации на физические и другие свойства препарата направляют в Государственный научно—исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича (119002, г. Москва, Сивцев Вражек, д. 41, телефон (495) 241—39—22), факс (495) 241-92-38 и в адрес предприятия, изготовившего препарат, ФГУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» (344000, г. Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 119, телефон (863) 234-91-83, факс 234-30-33, 234-91-83.

Директор ФГУН «Ростовский НИИ
микробиологии и паразитологии»
Роспотребнадзора



А.П.Шепелев