

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE****Регистрационный номер:****Торговое название.** Бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE**Группировочное наименование.** Бактериофаг сальмонеллезный**Лекарственная форма:** таблетки.**Состав.**

1 таблетка содержит:

Действующее вещество.

Очищенные бактериофаги, обладающие литической активностью в отношении бактерий рода *Salmonella* (с активностью по Апфельману) гр. А – *S. paratyphi A*; гр. В – *S. paratyphi B*, *S. heidelberg*; гр. С – *S. newport*, *S. choleraesuis*, *S. oranienburg*, *S. infantis*; гр. D – *S. dublin*, *S. enteritidis*; гр. Е – *S. anatum*, *S. newlands* – не менее 10^3 ; гр. В – *S. typhimurium* не менее 10^4 - 6,3 мг*

Вспомогательные вещества:

Кальция глюконат	- 56,3 мг*;
Декстрозы моногидрат	- 5,8 мг*;
Пектин	- 5,0 мг*;
Лактозы моногидрат	- 11,2 мг*;
Молоко обезжиренное, сухой остаток	- 11,4 мг*;
Тальк	- 3,0 мг*;
Кальция стеарат	- 1,0 мг*

* Содержание расчетное

Описание: Таблетка круглой формы, диаметром 7 мм, двояковыпуклая, с гладкой поверхностью, светло-бежевого цвета различной интенсивности, допускается неоднородность окраски в виде мраморности.

Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: отсутствует.

Код АТХ: V03A.

Фармакологические свойства. Препарат вызывает специфический лизис сальмонелл гр. А - *Salmonella paratyphi A*; гр. В - *S. paratyphi B*, *S. typhimurium*, *S. heidelberg*; гр. С - *S. newport*, *S. choleraesuis*, *S. oranienburg*, *S. infantis*; гр. D - *S. dublin*, *S. enteritidis*; гр. E - *S. anatum*, *S. newlands*.

Показания для применения. Лечение и профилактика заболеваний и бактерионосительства, вызванных сальмонеллами.

Противопоказания. Возраст до 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания. Целесообразно применение препарата при наличии инфекций, вызванных фагочувствительными штаммами (по рекомендации врача).

Способ применения и дозы.

Лечение и профилактика сальмонеллезов у взрослых и детей с одного года. Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности возбудителя и раннее применение препарата.

Для лечения препарат принимают 3 раза в день за 1 ч до приема пищи с первого дня заболевания в течение 7 - 10 дней. При заболевании, характеризующемся слабовыраженным колитическим синдромом, и в период реконвалесценции одновременно с приемом таблеток внутрь рекомендуется вводить ректально жидкий бактериофаг, в виде клизм после опорожнения кишечника вместо 1 приема через рот (см. Инструкцию по применению Бактериофага сальмонеллезного групп ABCDE раствора для приема внутрь и местного применения).

Рекомендуемые дозировки препарата

Возраст	Доза на 1 прием
От 1 года до 3 лет	1 таблетка
С 3 до 8 лет	1-2 таблетки
От 8 лет и старше	2-3 таблетки

В профилактических целях препарат рекомендуется применять для предупреждения бактерионосительства, внутрибольничной инфекции, во время групповых заболеваний в организованных коллективах и семьях. Оптимальные схемы

использования - ежедневный прием разовой возрастной дозы. Продолжительность приема препарата определяется условиями эпидситуации.

Побочное действие. Отсутствует.

Передозировка. Не установлена.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Применение возможно в сочетании с другими лекарственными средствами, в том числе с антибиотиками.

Особые указания. Не установлены.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.
Не установлено.

Форма выпуска. Таблетки. Во флаконах из стекла по 30 или 50 таблеток. По 10 флаконов вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия транспортирования. При температуре от 2 до 8 °С, допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 °С не более 1 месяца.

Условия хранения. При температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности. 2 года. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Условия отпуска. Отпускается без рецепта.

Производитель

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России.

Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.15, тел. (495) 710-37-87, факс (495) 783-88-04, e-mail: info@microgen.ru.

Адрес производства:

Россия, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 44, тел. (831) 434-42-77.

Организация, принимающая рекламации/претензии на качество препарата.

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России.

Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, д.15, тел. (495) 710-37-87, факс (495) 783-88-04, e-mail: info@microgen.ru.

Исполнительный директор
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России



О.В. Черничук