

Иммуноглобулин противостолбнячный (сравнительная характеристика)

Основные характеристики	Иммуноглобулин противостолбнячный человека (КНР)	Противостолбнячная сыворотка лошадиная (Россия) ПСС
Активные ингредиенты	Иммуноглобулины человека, специфические к возбудителю столбняка. Минимальный титр 100 МЕ/мл.	Иммуноглобулины лошади, специфические к возбудителю столбняка. Минимальный титр 1200 МЕ/мл.
Стабилизатор	Глицин	Хлороформ
Форма выпуска	Не менее 100 МЕ/мл 250 МЕ/флакон (100 МЕ/мл, 2,5 мл.)	3 тыс.МЕ, ампулы (2,3 – 5 мл); 10 тыс.МЕ, ампулы (10 мл.); 20 тыс.МЕ, ампулы (20 мл.) 50 тыс.МЕ, ампулы (20 мл.); в комплекте с сывороткой разведенной 1:100
Дозировка	профилактическая: 250 МЕ; терапевтическая: 3000 – 6000 МЕ	профилактическая: 3 тыс.МЕ; терапевтическая: 100 тыс.МЕ; 200 тыс.МЕ
Место введения	внутримышечно	При лечении: внутривенно или в спинномозговой канал Для профилактики: подкожно
Срок годности	2 года	3 года
Риск сенсибилизации	отсутствует (гомологичные антитела)	присутствует (гетерологичные антитела)
Кожный тест перед введением	не требуется	требуется
Необходимость применения антигистаминных препаратов	нет	имеется

В пункте 7.5 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22 октября 2013 г. Онищенко Г.Г. сказано: **Экстренную иммунопрофилактику столбняка** проводят в виде:

- пассивной иммунизации или серопротекции **противостолбнячным человеческим иммуноглобулином (ПСЧИ)**, а при его отсутствии - противостолбнячной сывороткой (ПСС);
- активно-пассивной профилактики, состоящей из одновременного введения в разные участки тела **противостолбнячного человеческого иммуноглобулина** (а при его отсутствии - ПСС) и столбнячного анатоксина (АС).